

Code taxon TAXAREF 5	Nom TAXREF 5	Nom vernaculaire	Indigénat	Cotation LRR	Critères	Remarques cotation	Endémicité à l'Auvergne	LRN	LRE	PN	LRR 2004
247073	Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775)	Procris du Prunellier (Le), Turquoise du P	I	VU	D2	AOO < 20 km². Menace : intensification des pratiques agricoles.					
247063	Adscita statices (Linnaeus, 1758)	Procris de l'Oseille (Le), Turquoise de la S	I	LC							
247064	Adscita geryon (Hübner, 1813)	Procris de l'Hélianthème (Le), Turquoise	I	LC							
247066	Adscita mannii (Lederer, 1853)	Procris vert brillant (Le), Turquoise des C	I	LC							
247071	Jordanita globulariae (Hübner, 1793)	Procris des Centaurées (Le), Turquoise de	I	VU	D2	AOO < 20 km². Menaces : enrichissement et fermeture du milieu ; intensification des pratiques agricoles.					
247061	Aglaope infausta (Linnaeus, 1767)	Aglaopé des haies (L'), Zygène des Epines	I	LC							
247040	Zygaena erythrus (Hübner, 1806)	Zygène rubiconde (La), Zygène écarlate (L)	I	VU	D2 et D1	AOO < 20 km². Menace : enrichissement et fermeture du milieu. Estimation à dire d'expert de moins de 1 000 imagos. 1 station dans le Cantal.					
247041	Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène diaphane (La), Zygène des Bouca	I	VU	D2	AOO < 20 km². Menaces : enrichissement et fermeture du milieu ; intensification des pratiques agricoles.					
247042	Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763)	Zygène pourpre (La), Zygène du Serpolet	I	LC							
247035	Zygaena sarpedon (Hübner, 1790)	Zygène des Panicauts (La)	I	LC							EN
247044	Zygaena fausta (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Petite coronille (La)	I	NT	pr. D2	AOO légèrement supérieure à 20 km². Menaces : enrichissement et fermeture du milieu.					
247045	Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)	Zygène du Sainfoin (La)	I	LC							
247050	Zygaena exulans (Hohenwarth, 1792)	Zygène des sommets (La), Zygène des alp	I	RE		1908 dans le Cantal, coll. Vergne (Muséum Henri-Lecoq).					
247054	Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène des Thérésiens (La), Zygène de la	I	LC							
247047	Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène de la Faucille (La), Zygène de l'Hi	I	LC							
247049	Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789)	Zygène de la Dorycnie (La), Zygène cendr	I	VU	D2 et D1	AOO < 20 km². Menace : enrichissement et fermeture du milieu. Estimation à dire d'expert de moins de 1 000 imagos, 2 stations dans le Cantal.				x	EN
247052	Zygaena romeo Duponchel, 1835	Zygène des Vesces (La)	I	LC							
247053	Zygaena osterodensis Reiss, 1921	Zygène de la Jarosse (La), Zygène de l'Or	I	CR	B2ab(ii)	AOO < 10 km². En régression et fragmentation. Déclin de la zone d'occupation et du nombre de localités.					VU
247056	Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Coronille variée (La), Zygène	I	LC							
247057	Zygaena transalpina (Esper, 1780)	Zygène transalpine (La), Zygène de l'Hipp	I	LC							
247058	Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)	Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filip	I	LC							
247059	Zygaena ionicerae (Scheven, 1777)	Zygène des bois (La), Zygène du Trèfle-de	I	LC							
247060	Zygaena trifolii (Esper, 1783)	Zygène des prés (La), Zygène des Cornett	I	LC							
53307	Erynnis tages (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie (Le), Grisette (La)	I	LC				LC	LC		
53291	Carcharodus alceae (Esper, 1780)	Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Pa	I	LC				LC	LC		
53294	Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)	Hespérie de l'Épiaire (L'), Hespérie de la L	I	VU	D2	AOO < 20 km². Menace : enrichissement et fermeture du milieu.		NT	NT		
608241	Carcharodus floccifer (Zeller, 1847)	Hespérie de la Bétoine (L'), Hespérie du N	I	VU	D2	AOO < 20 km². Menace : intensification des pratiques agricoles.		LC	NT		
53269	Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La),	I	LC				LC	LC		
53221	Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)	Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la	I	LC		Espèce regroupée avec P. malvoides. Zone de contact en Auvergne et existence d'hybride.		LC	LC		
219744	Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)	Hespérie de l'Aigremoine (L'), Hespérie d	I	LC		Espèce regroupée avec P. malvae. Zone de contact en Auvergne et existence d'hybride.		LC	LC		
53236	Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)	Hespérie des Potentilles (L'), Armoricain	I	LC				LC	LC		
53229	Pyrgus alveus (Hübner, 1803)	Hespérie du Faux-Buis, Plain-Chant (Le),	I	LC				LC	LC		
53242	Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)	Hespérie de l'Alchémille (L'), Hespérie de	I	LC				LC	LC		
53248	Pyrgus cirsii (Rambur, 1839)	Hespérie des Cirsés (L')	I	LC				NT	VU		
53251	Pyrgus onopordi (Rambur, 1839)	Hespérie de la Malope (L'), Vergeté (Le)	I	NT	pr. D2	AOO légèrement supérieure à 20 km². Menace : enrichissement et fermeture du milieu.		LC	LC		VU
219743	Pyrgus carthami (Hübner, 1813)	Hespérie du Carthame (L'), Bigarré (Le), C	I	LC				LC	LC		
53315	Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)	Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Pa	I	LC				LC	LC		
53312	Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)	Miroir (Le), Stéropé (Le)	I	LC				LC	LC		VU
53320	Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)	Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Act	I	LC				LC	NT		
219742	Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque (L'), Thaumás (Le)	I	LC				LC	LC		
219741	Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie europe	I	LC				LC	LC		

53332	Hesperia comma (Linnaeus, 1758)	Virgule (La), Comma (Le)	I	LC				LC	LC		
219740	Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)	Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)	I	LC				LC	LC		
608257	Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)	Apollon (L')	I	EN	B2ab(ii,iii)	AOO < 20 Km <sup>2</sup> . Fragmentation et très forte régression de l'aire d'occupation de l'espèce : 194 km <sup>2</sup> en 1970, 95 km <sup>2</sup> en 1990 et 20 km <sup>2</sup> en 2012 . Fort déclin du nombre de localités, de la superficie et de la qualité de l'habitat. Disparu des monts du Forez, réintroduit sur la chaîne des Puys.		EN	NT	x	CR
608263	Parnassius mnemosyne montdorensis Kolar, 1943	Semi-Apollon (Le)	I	EN	B2ab(ii)	AOO > 10 Km <sup>2</sup> . En régression et fragmentation. Déclin de la zone d'occupation et du nombre de localités.		NT	NT	x	CR
54468	Papilio machaon Linnaeus, 1758	Machaon (Le)	I	LC				LC	LC		
54475	Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)	Flambé (Le)	I	LC				LC	LC		
54376	Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)	Piérade du Lotier (La), Piérade de la Mout	I	LC				LC	LC		
608272	Leptidea juvernica Williams, 1946	Piérade irlandaise (La), Piérade d'Irlande (L)	I	NT	pr. D2	D2 < 20 km <sup>2</sup> ; mais espèce méconnue. Pas de menaces identifiées.		LC	LC		
54339	Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)	Gazé (Le), Piérade de l'Aubépine (La), Piér	I	LC				LC	LC		
54342	Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou (La), Grande Piérade du C	I	LC				LC	LC		
219831	Pieris rapae (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Ch	I	LC				LC	LC		
219830	Pieris mannii (Mayer, 1851)	Piérade de l'Ibérade (La), Piérade jumelle (L)	I	LC		AOO < 20 km <sup>2</sup> . Ajustement à la baisse par le groupe d'expert. Espèce découverte en Auvergne en 2004 et en expansion depuis cette date. Apports de migrants certains dans l'implantation de l'espèce. Aucune menace identifiée, adaptation possible à des habitats de substitution en milieu urbain.		LC	LC		
219833	Pieris napi (Linnaeus, 1758)	Piérade du Navet (La), Papillon blanc vein	I	LC				LC	LC		
54362	Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert (Le), Piérade du Réséda (L)	I	VU	D2	AOO < 20 km <sup>2</sup> . Menaces : enrichissement et fermeture du milieu.		LC	LC		
54451	Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)	Aurore (L')	I	LC				LC	LC		
54456	Anthocharis belia euphenoides Staudinger, 1869	Aurore de Provence (L')	I	DD				LC	LC		
54433	Euchloe crameri Butler, 1869	Piérade des Biscutelles (La)	I	VU	D2	AOO < 20 km <sup>2</sup> . Menaces : enrichissement et fermeture du milieu.		LC	LC		
54384	Colias hyale (Linnaeus, 1758)	Soufré (Le), Piérade soufrée (La), Soufre (L)	I	DD		données fiables disponibles insuffisantes.		LC	LC		
219826	Colias alfaciensis Ribbe, 1905	Fluoré (Le)	I	DD		données fiables disponibles insuffisantes.		LC	LC		
	Colias croceus (Geoffroy, 1785)	Souci (Le)	I	LC				LC	LC		
54417	Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le), Piérade du Nerpru	I	LC				LC	LC		
54419	Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)	Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), P	I	NA		erratique ne se reproduisant pas dans la région.		LC	LC		
53969	Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)	Lucine, Fauve à taches blanches, Faune à	I	LC				LC	LC		
54319	Thecla betulae (Linnaeus, 1758)	Thécla du Bouleau (La), Thècle du Boulea	I	LC				LC	LC		
54322	Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)	Thécla du Chêne (La), Porte-Queue bleu	I	LC				LC	LC		
219760	Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)	Thécla de l'Amarel (La), Thécla de l'Acacia	I	LC				LC	LC		
219758	Satyrium ilicis (Esper, 1779)	Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte	I	LC				LC	LC		
219755	Satyrium w-album (Knoch, 1782)	Thécla de l'Orme (La), Thécla à W blanc (L)	I	LC				LC	LC		VU
219756	Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)	Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrie	I	LC				LC	LC		VU
219757	Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)	Thécla des Nerpruns (La), Thécla du Prun	I	VU	D2 et D1	AOO < 10 km <sup>2</sup> . Menace : enrichissement et fermeture du milieu. Estimation à dire d'expert de moins de 1 000 imagos, 3 stations (Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme).		LC	LC		
54307	Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)	Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')	I	LC				LC	LC		
53973	Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)	Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), B	I	LC				LC	LC		
53976	Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cuivré de la Bistorte (Le), Cuivre violacé (L)	I	LC				NT	EN	x	VU
219750	Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)	Cuivré de la Verge-d'or (Le), Cuivré satiné	I	LC				LC	LC		
219751	Lycaena tityrus (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), F	I	LC				LC	LC		
219752	Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)	Cuivré mauvin (Le), Cuivré flamboyant (L)	I	NT	pr. B2b(iii)	Déclin de l'étendue et de la qualité de l'habitat.		LC	LC		
53979	Lycaena dispar (Haworth, 1802)	Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le)	I	LC		Espèce en expansion malgré le déclin de la qualité de l'habitat (dégradation des zones humides de plaine) compensé par la capacité de colonisation de l'espèce.		LC	LC	x	EN
219753	Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)	Cuivré écarlate (Le)	I	LC				LC	LC		
219795	Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)	Azuré de la Luzerne (L'), Argus courte-qu	I	NA		erratique ne se reproduisant pas dans la région		LC	LC		
54021	Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue (L'), Argus porte-queu	I	LC				LC	LC		
219796	Cacyreus marshalli Butler, 1898	Brun du pélargonium (Le), Argus des Péla	E	NA		espèce allochtone arrivée 1998 en Auvergne.		NA	NA		
54052	Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande n	I	LC				LC	LC		

219794	Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)	Azuré de la Faucille (L'), Argus rase-queue (L')	I	LC				LC	LC		
219793	Cupido argiades (Pallas, 1771)	Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte-Queue (L')	I	LC				LC	LC		
54031	Cupido osiris (Meigen, 1829)	Azuré de la Chevrette (L'), Petit Argus (L')	I	VU	D2	AOO < 20 km <sup>2</sup> . Menace : enrichissement et fermeture du milieu.		LC	LC		VU
54029	Cupido minimus (Fuessly, 1775)	Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène (L')	I	LC				LC	LC		
54075	Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)	Azuré des Cytises (L')	I	LC				LC	LC		
54080	Maculineaalcon (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de la Pulmonaire (L'), Azuré des Moutons (L')	I	NT	pr. B2b(iii)	Déclin de la qualité de l'habitat (vieillessement de la plante hôte sur de nombreuses stations pour M.alconalcon).		NT	LC	x	EN
54085	Maculinea arion (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Azuré des Moutons (L')	I	VU	B2ab(ii)	AOO > 10 Km <sup>2</sup> . En régression et fragmentation. Déclin de la zone d'occupation et du nombre de localités.		LC	EN	x	
54055	Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)	Azuré du Thym (L'), Azuré de la Sariette (L')	I	LC				LC	LC		
54065	Scolitantides orion (Pallas, 1771)	Azuré des Orpins (L'), Polyommate de l'Orion (L')	I	LC				LC	LC		VU
54213	Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (L')	I	LC				LC	LC		
219765	Polyommatus thersites (Cantener, 1835)	Azuré de L'Esparcette (L'), Argus bleu roi (L')	I	LC				LC	LC		
54279	Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Argus bleu-nacré (L')	I	LC				LC	LC		
219768	Polyommatus coridon (Poda, 1761)	Argus bleu-nacré (L')	I	LC				LC	LC		
219767	Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (L'), Argus bleu-nacré (L')	I	LC				LC	LC		
521494	Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail (L'), Argus brun (L')	I	LC				LC	LC		
54191	Eumedonia eumedon (Esper, 1780)	Argus de le Sanguinaire (L'), Eumédon (L')	I	LC				LC	LC		
54105	Plebejus argus (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L')	I	LC				LC	LC		
54126	Plebejus idas (Linnaeus, 1761)	Azuré du Genêt (L'), Argus sagitté (L'), Bleu de France (L')	I	LC				LC	LC		
54170	Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)	Azuré des Coronilles (L'), Azuré porte-arc (L')	I	LC				LC	LC		
53965	Libythea celtis (Laicharting, 1782)	Échancré (L'), Libythée du Micocoulier (L')	I	NA		erratique ne se reproduisant pas dans la région.		LC	LC		
53595	Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)	Tircis (L'), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	I	LC				LC	LC		
53604	Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)	Mégère (L'), Satyre (L')	I	LC				LC	LC		
53609	Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)	Némusien (L'), Ariane (L'), Némutien (L')	I	LC				LC	LC		
53615	Lopinga achine (Scopoli, 1763)	Bacchante (L'), Déjanire (L')	I	RE		1967 pour le Puy-de-Dôme coll. P. Ginibre (Muséum Henri-Lecoq) ; 1965 pour l'Allier A. Deshommais.		NT	VU	x	
53661	Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)	Céphale (L'), Arcanie (L')	I	LC				LC	LC		
631141	Coenonympha gardetta lecerfi de Lesse, 1949	Fadet forésien (L'), Satyrion du Forez (L')	I	LC				VU	LC		VU
53651	Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)	Mélibée (L'), Moelibée (L'), Fadet de l'Étang (L')	I	RE		1965 pour le Puy-de-Dôme coll. P. Ginibre (Muséum Henri-Lecoq) ; 1944 pour l'Allier bibliographie H. De Lesse.		VU	CR	x	
53631	Coenonympha tullia (Müller, 1764)	Fadet des tourbières (L'), Daphnis (L')	I	RE		1914 pour l'Allier bibliographie Abbé Berthoumieu.		VU	EN	x	
53623	Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (L'), Procris (L'), Petit Paillard (L')	I	LC				LC	LC		
608405	Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (L'), Titon (L')	I	LC				LC	LC		
219799	Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)	Tristan (L')	I	LC				LC	LC		
53676	Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)	Misis (L'), Lycaon (L'), Bioculé (L')	I	RE		1936 pour le Puy-de-Dôme coll. Des Forest (Muséum Henri-Lecoq).		LC	LC		
53668	Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)	Myrtil (L'), Myrtille (L'), Jurtine (L'), Janin (L')	I	LC				LC	LC		
53449	Erebia ligea (Linnaeus, 1758)	Moiré blanc-fascié (L'), Grand nègre honnête (L')	I	LC				LC	LC		
53451	Erebia euryale (Esper, 1805)	Moiré frange-pie (L'), Moiré frangé (L')	I	LC				LC	LC		
647110	Erebia manto constans Eiffinger, 1907	Moiré variable (L'), Petit Nègre hongrois (L')	I	LC				LC	LC		EN
53467	Erebia epiphron (Knoch, 1783)	Moiré de la Canche (L'), Moiré alpestre (L')	I	LC				LC	LC		
608398	Erebia sudetica liorana de Lesse, 1947	Moiré des Sudètes (L')	I	LC		AOO > 20 km <sup>2</sup> . Sous-espèces endémique aux monts du Cantal, aucun déclin ou fragmentation constatés.	x	VU	VU	x	VU
53483	Erebia aethiops (Esper, 1777)	Moiré sylvicole (L'), Nègre à bandes fauves (L')	I	LC				LC	LC		
53487	Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré franconien (L'), Franconien (L'), Nègre (L')	I	RE		1914 pour l'Allier bibliographie Abbé Berthoumieu.		LC	LC		
53524	Erebia cassioides (Reiner & Hohenwarth, 1792)	Moiré lustré (L')	I	VU	D2	AOO < 20 km <sup>2</sup> . Localisé au-dessus de 1500 m d'une part au puy de Sancy et sommets adjacents et d'autre part au massif adventif de l'Angle (Puy-de-Dôme). Menaces : modification des pratiques agricoles, aménagement de la zone subalpines des monts Dore.		LC	LC		EN
608391	Erebia ottomana tardenota Praviel, 1941	Moiré ottoman (L')	I	NT	VU (D2) (-1)	AOO < 20 km <sup>2</sup> . Menaces : enrichissement et fermeture du milieu ; intensification des pratiques agricoles ; enrésinement. Ajustement à la baisse car apports de migrants possible des départements de l'Ardèche et de la Lozère.		LC	LC		VU
53562	Erebia neoridas (Boisduval, 1828)	Moiré automnal (L')	I	LC				LC	LC		EN

53564	Erebia oeme (Hübner, 1804)	Moiré des Luzules (Le), Moiré (Le), Moiré	I	LC				LC	LC		
647125	Erebia meolans (Prunner, 1798)	Moiré des Fétuques (Le)	I	LC				LC	LC		
53700	Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier	I	LC				LC	LC		
53367	Brintesia circe (Fabricius, 1775)	Silène (Le), Circé (Le)	I	LC				LC	LC		
53364	Minois dryas (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La)	I	LC				LC	LC		VU
53370	Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercure (Le), Petit Agreste (Le)	I	CR	B2ab(ii)	AOO < 10 Km <sup>2</sup> . En forte régression et fragmentation. Déclin de la zone d'occupation et du nombre de localités.		LC	LC		VU
53425	Chazara briseis (Linnaeus, 1764)	Hermite (L'), Ermite (L')	I	CR	B2ab(ii, iii)	AOO < 10 Km <sup>2</sup> . En forte régression et fragmentation. Déclin de la zone d'occupation, du nombre de localités, de la superficie et de la qualité de l'habitat.		NT	VU		CR
53358	Satyrus ferula (Fabricius, 1793)	Grande Coronide (La), Pupillé (Le), Semi-	I	VU	D2	AOO < 10 km <sup>2</sup> . Menace : enrichissement et fermeture du milieu. Estimation à dire d'expert de moins de 1 000 imagos, 1 station en Haute-Loire.		LC	LC		EN
53356	Satyrus actaea (Esper, 1781)	Petite Coronide (La), Actéon (L'), Coronis	I	LC				LC	LC		EN
219806	Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)	Faune (Le), Arachné (L'), Coronis (Le)	I	LC				LC	NT		VU
53378	Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767)	Chevron blanc (Le), Faune (Le), Ocellé pir	I	RE		1938 pour le Puy-de-Dôme coll. Des Forest (Muséum Henri-Lecoq).		LC	LC		
53391	Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)	Agreste (L')	I	LC				LC	LC		
53379	Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Sylvandre (Le)	I	DD		données fiables disponibles insuffisantes.		LC	LC		
219807	Hipparchia genava (Fruhstorfer, 1908)	Sylvandre helvète (Le)	I	LC				LC	LC		
53376	Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)	Sylvandre (Le), Portier de la forêt (Le), Sil	I	LC				LC	NT		
53789	Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)	Nymphale de l'Arbousier (La), Jason (Le),	I	NA		erratique ne se reproduisant pas dans la région.		LC	LC		
53786	Apatura iris (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant (Le), Grand Mars	I	LC				LC	LC		
53783	Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le)	I	NT	pr. B2b(iii)	Déclin del'étendue et de la qualité de l'habitat.		LC	LC		
53878	Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Ba	I	LC				LC	LC		
219820	Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)	Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacr	I	LC				LC	LC		
219821	Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le)	I	LC				LC	LC		
219822	Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)	Chiffre (Le)	I	LC				NT	LC		
53908	Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le)	I	LC				LC	LC		
53911	Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré de la Filipendule (Le), Agavé (L')	I	VU	D2	AOO < 20 km <sup>2</sup> . Menace : enrichissement et fermeture du milieu. Estimation à dire d'expert de moins de 1 000 imagos, 2 stations dans le Cantal.		LC	LC		EN
646236	Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le),	I	LC				LC	LC		
53915	Brenthis ino (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des r	I	LC				LC	LC		
53926	Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)	Nacré de la Canneberge (Le), Nacré des t	I	CR	B2ab(i, iii)	AOO < 10 Km <sup>2</sup> . En forte régression et fragmentation. Déclin de la zone d'occupation, du nombre de localités, de l'étendue et de la qualité de l'habitat.		NT	LC	x	CR
219817	Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Collier argenté (Le), Nacré fléché (Le)	I	LC				NT	LC		
219815	Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté	I	LC				LC	LC		
608341	Boloria titania (Esper, 1794)	Nacré porphyrin (Le), Alezan (L'), Jason (L)	I	LC				LC	NT		
219818	Boloria dia (Linnaeus, 1767)	Petite Violette (La), Nacré violet (Le)	I	LC				LC	LC		
53765	Limenitis populi (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain (Le), Nymphale du Peuplie	I	EN	B2ab(ii, iii)	AOO > 10 Km <sup>2</sup> . En régression et fragmentation. Déclin de la zone d'occupation, du nombre de localités et de la qualité de l'habitat.		NT	LC		EN
53770	Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le),	I	LC				LC	LC		
53767	Limenitis reducta Staudinger, 1901	Sylvain azuré (Le), Camille (Le)	I	LC				LC	LC		
53733	Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)	Morio (Le), Manteau royal (Le), Velours (	I	EN	B2ab(ii)	AOO > 10 Km <sup>2</sup> . En régression et fragmentation. Déclin de la zone d'occupation et du nombre de localités.		LC	LC		
53727	Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (L)	I	LC				LC	LC		
53754	Aglais urticae (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La)	I	LC				LC	LC		
608364	Aglais io (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil	I	LC				LC	LC		
53741	Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)	Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain	I	LC				LC	LC		
53747	Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (	I	LC				LC	LC		
53759	Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blar	I	LC				LC	LC		
53724	Araschnia levana (Linnaeus, 1758)	Carte géographique (La), Jaspé (Le)	I	LC				LC	LC		
53817	Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain (Le), Déesse à ceintu	I	LC				LC	LC		
53821	Melitaea diamina (Lang, 1789)	Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), A	I	LC				LC	LC		
53811	Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélitée des Centaurées (La), Grand Dam	I	LC				LC	LC		

53794	Melitaea didyma (Esper, 1778)	Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le)	I	LC				LC	LC		
219812	Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)	Mélitée du Mélampyre (La), Damier Atha	I	LC		Espèce regroupée avec M. celadussa. Zone de contact en Auvergne.		LC	LC		
608362	Melitaea celadussa Fruhstorfer, 1910	Mélitée de Fruhstorfer (La)	I	LC		Espèce regroupée avec M. athalia. Zone de contact en Auvergne.		LC	LC		
219808	Melitaea deione (Geyer, 1832)	Mélitée des Linaires (La)	I	VU	D2	AOO < 20 km <sup>2</sup> . Menace : enrichissement et fermeture du milieu. Estimation à dire d'expert de moins de 1 000 imagos, 3 stations (Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme)		LC	LC		
219810	Melitaea parthenoides Keferstein, 1851	Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des s	I	LC				LC	LC		
53865	Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)	Damier de la Sucisse (Le), Artémis (L'), Da	I	NT	pr. B2b(iv)	Déclin des sous-populations de plaine, de l'étendue et de la qualité de l'habitat en plaine..		LC	LC	x	

**Evaluation particulière de rang infra-spécifique**

Code taxon TAXAREF 5	Nom TAXREF 5	Nom vernaculaire	Indigénat	Cotation LRR	Critères	Remarques cotation	Endémicité à l'Auvergne	LRN	LRE	PN	LRR 2004
608282	Lycaena helle arvernica Bernardi & De Lesse, 1952	Cuivré de la Bistorte (Le), Cuivre violacé (L')	I	LC		Sous-espèces endémique au Puy-de-Dôme et Cantal, aucun déclin ou fragmentation constatés.	x	NT	EN	x	VU
608286	Lycaena helle magdalenae Guérin, 1959	Cuivré de la Bistorte (Le), Cuivre violacé (L')	I	CR	B2ab(ii)	AOO < 10 Km <sup>2</sup> . En forte régression et fragmentation. Déclin de la zone d'occupation, du nombre de localités de la superficie et de la qualité de l'habitat. Sous-espèce endémique aux monts de la Madeleine (Allier et Loire), toutes les stations sont en limites départementales. Population introduite des monts du Forez non pris en compte car en dehors de son aire de répartition naturelle.		CR	EN	x	VU
54080	Maculineaalcon écotypealcon (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de la Pulmonaire (L'), Azuré des M	I	NT	pr. B2b(iii)	Déclin de la qualité de l'habitat (vieillessement de la plante hôte sur de nombreuses stations).		NT	LC	x	EN
54080	Maculineaalcon écotyperebeli (Hirschke, 1904)	Azuré de la Croisette (L')	I	VU	D2	AOO < 20 km <sup>2</sup> . Menace : enrichissement et fermeture du milieu.		NT	LC		CR